



in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Landesärztekammer

## Fragen zum Thema „Der neuropathische Fußschmerz und seine Differentialdiagnosen“

### 1. Wieviel Knochen bilden das Fußskelett?

- a) 22
- b) 28
- c) 26
- d) 30
- e) 24

### 2. Welcher Nerv ist kein Abgang des N. tibialis?

- a) Rami articulares distales
- b) Rr. calcaneares mediales
- c) N. suralis
- d) N. plantaris lateralis
- e) N. cutaneus surae lateralis

### 3. Welcher Nerv versorgt den ersten Interdigitalraum sensibel?

- a) N. peroneus profundus
- b) N. peroneus superficialis
- c) N. cutaneus dorsalis medialis
- d) N. cutaneus dorsalis intermedius
- e) N. suralis

### 4. Welcher Nerv hat eine Präferenz für die Morton – Metatarsalgie?

- a) N. digitalis plantaris communis IV
- b) N. digitalis plantaris communis III
- c) N. plantaris lateralis
- d) N. dorsalis digiti II medialis
- e) N. dorsalis hallucis I medialis

### 5. Der Baxter-Nerv ist ein Abgang des

- a) N. suralis.
- b) N. peroneus communis.
- c) N. peroneus profundus.
- d) N. plantaris lateralis
- e) N. plantaris medialis.

### 6. Was ist kein Merkmal der Erythromelalgie?

- a) Schmerz, Rötung, Schwellung
- b) Schmerzauslösung durch Wärme und körperliche Belastung
- c) sensibilisierte C-Fasern
- d) Dilatation der Hautgefäße
- e) intermittierende Paresen

### 7. Das Restless-legs-Syndrom ist nicht gekennzeichnet durch

- a) Missempfindungen der Beine und Bewegungsdrang.
- b) zirkadiane Rhythmik.
- c) Bewegungsschmerz.
- d) Schlafstörungen.
- e) L-Dopa-Response.

### 8. Was ist eine häufige Differenzialdiagnose der Neuralgie des Baxter-Nerv?

- a) Joplin-Neurom.
- b) Plantarfasciitis.
- c) Early-morning-Dystonie.
- d) Achillodynie.
- e) hinteres Tarsaltunnelsyndrom.

## CME-Fortbildung online

Die Teilnahme an der CME-Fortbildung ist für 12 Monate ausschließlich online möglich. Zur Anmeldung gehen Sie bitte auf [cme.schattauer.de](http://cme.schattauer.de). Dort erfahren Sie auch den genauen Teilnahmeabschluss. Es ist immer nur eine Antwort pro Frage zutreffend. Als Leser der *Nervenheilkunde* nehmen Sie kostenlos am CME-Programm teil. Je nach CME-Fortbildung erhalten Sie bis zu vier Fortbildungspunkte. Weitere Informationen zur Anmeldung und Registrierung finden Sie unter [cme.schattauer.de](http://cme.schattauer.de). Sie erhalten bei inhaltlichen und technischen Fragen tutoriellen Support.

### 9. Bei welchem Fußschmerz werden zentrale und periphere Mechanismen der Pathophysiologie diskutiert?

- a) Erythromelalgie.
- b) Segawa-Syndrom.
- c) idiopathisches RLS.
- d) CRPS.
- e) Morton-Metatarsalgie.

### 10. Welche neurologische Ursache des Fußschmerzes ist ohne Gefahr des Mobilitätsverlustes?

- a) CRPS.
- b) Segawa-Syndrom.
- c) Jogger's foot.
- d) L5/S1-Syndrom.
- e) Polyneuropathie.